

AQS1-Kinder Quartalsauswertung

1. Quartal 2018, Praxis 5347

Grundgesamtheit

| | Aktuelle Periode | Alle Perioden | |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|
| | Praxis | Praxis | Alle Praxen* |
| Arzt-Fragebögen | 8 | 465 | 40.864 |
| Patienten-Fragebögen | 4 | 181 | 18.166 |
| Patienten-Rücklaufquote | 50% | 39% | 44% |

*) Repräsentative Menge Fragebögen aus dem Gesamtkollektiv aller Praxen (1. Quartal 2012 bis 4. Quartal 2017)

1. Allgemeine Daten zum Patienten

Geschlecht

| | Praxis | Gesamt |
|----------|--------|--------|
| Männlich | 50% | 73% |
| Weiblich | 50% | 27% |

Altersverteilung

| Alter in Jahren | bis 1 | 2 bis 3 | 4 bis 6 | 7 bis 10 | 11 bis 15 | ab 16 |
|-----------------|-------|---------|---------|----------|-----------|-------|
| Praxis | 0,0% | 25,0% | 62,5% | 12,5% | 0,0% | 0,0% |
| Gesamt | 5,6% | 25,2% | 43,7% | 17,6% | 7,1% | 0,8% |

Ehemaliges Früh-/Mangelgeborenes

| | Praxis | Gesamt |
|-----------------------|--------|--------|
| Früh-/Mangelgeborenes | 0% | 0% |


Krankenversicherung

| | Praxis | Gesamt |
|--------------|--------|--------|
| Gesetzlich | — | 98% |
| Privat | — | 1% |
| Selbstzahler | — | 0% |

Wahl der Praxisklinik

| | Praxis | Gesamt |
|--------------------------|--------|--------|
| Überweisung Hausarzt | — | 9,1% |
| Überweisung Kinderarzt | — | 35,1% |
| Vorerfahrung | — | 20,5% |
| Empfehlung | — | 23,9% |
| Telefonbuch/Branchenbuch | — | 0,6% |
| Internet | — | 3,2% |
| Sonstiges | — | 16,3% |

Legende



MW=Mittelwert, SD=75% Standardabweichung

2. Gesundheitszustand des Patienten

Beeinträchtigung durch Erkrankung

| | Praxis | Gesamt |
|------------|--------|--------|
| Gar nicht | — | 40% |
| Gering | — | 28% |
| Mittel | — | 21% |
| Stark | — | 10% |
| Sehr stark | — | 1% |

Rückkehr in normale Aktivität

| | Praxis | Gesamt |
|-------------|--------|--------|
| Nach der OP | — | 6,9 |

Zeitangabe in Tagen

Wundkontaminationsklasse

| | Praxis | Vergleich |
|-------------------|--------|-------------------|
| Aseptisch | 12,5% | 13,2% 50,7% 88,2% |
| Bedingt aseptisch | 87,5% | 3,2% 39,9% 76,6% |
| Kontaminiert | 0,0% | 8,3% 29,0% |
| Septisch | 0,0% | 1,2% 9,3% |

Medizinische Risikofaktoren

| | Praxis | Vergleich |
|---------------------|--------|-------------|
| Herz-Kreislauf | 0,0% | 0,7% 7,0% |
| Gerinnungsstörung | 0,0% | 0,1% 3,0% |
| Respirationstrakt | 0,0% | 11,5% 35,5% |
| Thromboserisiko | 0,0% | 0,0% 1,6% |
| Adipositas | 0,0% | 0,8% 7,7% |
| Diabetes | 0,0% | 0,1% 1,8% |
| Allergie | 0,0% | 2,4% 13,8% |
| Stoffwechselstörung | 0,0% | 0,2% 3,8% |
| Krampfleiden | 0,0% | 0,2% 3,8% |
| Sonstiges | 0,0% | 6,6% 25,2% |

Dringlichkeit des Eingriffs

| | Praxis | Vergleich |
|-----------|--------|-------------|
| Elektiv | 100,0% | 93,6% 99,4% |
| Dringlich | 0,0% | 0,5% 6,0% |
| Notfall | 0,0% | 0,1% 2,0% |

3. Operation

Allgemeine Daten

| | Praxis | Vergleich |
|---|--------|-------------|
| Aufklärung zur Narkose vor dem OP-Tag | 87,5% | 41,0% 74,0% |
| Aufklärung zur Operation vor dem OP-Tag | 100,0% | 93,7% 99,4% |
| Second Opinion | 100,0% | 15,4% 42,6% |
| Primäreingriff | 75,0% | 81,6% 96,1% |
| Histologie entnommen | 0,0% | 28,4% 62,3% |
| Diagnose intraoperativ bestätigt | 100,0% | 94,5% 99,5% |

Verschiebung des OP-Termins

| | Praxis | Vergleich |
|----------------------------|--------|-----------|
| Einmal verschoben | — | 9,5% |
| Mehr als einmal verschoben | — | 1,6% |

| | Praxis | Vergleich |
|---|--------|-----------|
| Wegen Erkrankung (festgestellt: Kinder-/Hausarzt) | — | 7,0% |
| Wegen Erkrankung (festgestellt: Narkosearzt) | — | 1,0% |
| Aus organisatorischen Gründen | — | 3,6% |

Kurz vor der OP

| | Praxis | Vergleich | Verlauf |
|--|--------|-----------|-----------------------|
| Wartezeit OP-Termin bis OP-Beginn (Minuten) | — | 35,6 | 44,5 32,2 18,9% |
| Hektische Atmosphäre vor der Narkoseeinleitung | — | 6,8% | 0,0% 48,6% |
| Bei Narkoseeinleitung war Kind ängstlich/unruhig | — | 31,8% | 13,7% |

Q2 Q3 Q4 Q1/2018

Prämedikation

| | Praxis | Vergleich |
|---------------------|--------|-------------------|
| Keine | 50,0% | 16,4% 53,8% 91,2% |
| Midazolam < 0,3 | 0,0% | 10,0% 32,4% |
| Midazolam 0,3 | 50,0% | 9,6% 31,7% |
| Midazolam 0,4 | 0,0% | 10,8% 34,1% |
| Midazolam 0,5 | 0,0% | 14,6% 41,1% |
| Midazolam 0,6 | 0,0% | 0,6% 6,6% |
| Midazolam > 0,6 | 0,0% | 0,6% 6,2% |
| Sonstige Medikation | 0,0% | 14,7% 41,2% |

Midazolam in mg/kg KG

| | Praxis | Vergleich |
|---------------------|--------|-----------|
| Orale Applikation | — | 88,8% |
| Nasale Applikation | — | 2,5% |
| Rektale Applikation | — | 8,7% |

| | Praxis | Vergleich |
|--------------|--------|-----------|
| Unzureichend | — | 3,5% |
| Gut | — | 96,4% |
| Überdosiert | — | 0,1% |

OP-Organisation

| | Praxis | Vergleich |
|---------------------|--------|----------------|
| Einleitungszeit | 4,5 | 3,4 7,6 11,9 |
| Schnitt-Naht-Zeit | 14,8 | 16,6 28,7 40,8 |
| OP-Blockierungszeit | 25,6 | 30,3 44,4 58,5 |

Zeitangabe in Minuten

Assistenz

| | Mindestens eine | | Durchschn. Anzahl | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Praxis | Vergleich | Praxis | Vergleich |
| Ärztlich/Operateur | 0,0% | 9,3% 31,1% | 0,0 | 0,1 0,3 |
| Nicht ärztl./Operateur | 100,0% | 82,7% 96,5% | 1,0 | 0,8 1,1 1,4 |
| Nicht ärztl./Anästhesist | 87,5% | 86,2% 97,6% | | |

Perioperative Medikation

| | Prä-OP | | Intra-OP | | Post-OP | |
|------------------|--------|------------------|----------|-------------------|---------|-------------|
| | Praxis | Vergleich | Praxis | Vergleich | Praxis | Vergleich |
| Analgetika | 75,0% | 2,4% 39,0% 75,5% | 87,5% | 51,7% 81,1% | 0,0% | 18,6% 47,8% |
| Antibiotika | 0,0% | 0,2% 3,4% | 0,0% | 2,0% 12,6% | 0,0% | 0,7% 7,1% |
| Antiemetika | 25,0% | 3,8% 18,1% | 75,0% | 27,5% 60,9% | 0,0% | 2,4% 13,8% |
| Antikoagulantien | 0,0% | 0,1% 1,8% | 0,0% | 0,2% 2,8% | 0,0% | 0,0% 1,5% |
| Antihypertensiva | 0,0% | 0,4% 5,0% | 0,0% | 1,2% 9,1% | 0,0% | 0,0% 1,4% |
| Anticholinergika | 0,0% | 2,8% 15,3% | 0,0% | 3,4% 17,0% | 0,0% | 0,1% 2,0% |
| Antihypotensiva | 0,0% | 0,1% 1,8% | 0,0% | 0,2% 3,5% | 0,0% | 0,0% 1,1% |
| O2-Insufflation | 12,5% | 13,9% 39,8% | 0,0% | 29,2% 63,3% | 0,0% | 20,7% 51,1% |
| Sedativa | 50,0% | 22,5% 53,6% | 0,0% | 31,1% 65,8% | 0,0% | 1,2% 9,4% |
| Lokalanästhetika | 0,0% | 4,8% 20,6% | 0,0% | 35,8% 71,7% | 0,0% | 3,6% 17,5% |
| Infusion | 0,0% | 5,5% 22,7% | 0,0% | 24,4% 61,0% 97,6% | 0,0% | 9,7% 31,8% |
| Sonstiges | 0,0% | 3,2% 16,5% | 0,0% | 14,4% 40,6% | 0,0% | 0,6% 6,6% |

Studienfeld

| | A | B | C | D | E | F |
|-------------|------|-------|------|------|------|------|
| Studienfeld | 0,0% | 87,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

Anästhesiedurchführung

| | Praxis | Vergleich |
|-------------|--------|--------------|
| Anästhesist | 100,0% | 98,5% 100,0% |
| Operateur | 0,0% | 0,0% 1,5% |

Narkose Einleitung

| | Praxis | Vergleich |
|-------|--------|-------------------|
| Maske | 14,3% | 0,2% 36,3% 72,4% |
| i.v. | 85,7% | 27,6% 63,7% 99,6% |

Art der Anästhesie

| | Praxis | Vergleich |
|---------------------|--------|-------------------|
| Intubationsnarkose | 0,0% | 28,2% 61,9% |
| Maskennarkose | 0,0% | 5,0% 21,3% |
| Kaudalanästhesie | 0,0% | 1,3% 9,8% |
| Larynxmaske | 100,0% | 27,6% 63,7% 99,7% |
| Plexusanästhesie | 0,0% | 0,1% 2,3% |
| Peniswurzelblockade | 0,0% | 17,0% 45,2% |
| Lokalanästhesie | 0,0% | 10,8% 34,0% |
| Nervenblockade | 0,0% | 1,4% 10,2% |
| Sonstiges | 0,0% | 0,2% 3,6% |

4. Komplikationen

Komplikationen intraoperativ Operateur

| | Praxis | Vergleich | Verlauf |
|----------------------|--------|--------------|---------|
| Blutung | 0,0% | 0,4% 5,1% | 4,7% |
| Techn./Instrumentell | 0,0% | 0,1% 2,9% | 2,8% |
| Nervenläsion | 0,0% | 0,0% 0,4% | 0,4% |
| Abbruch der OP | 0,0% | 0,0% 0,8% | 0,7% |
| Gewebsläsion | 0,0% | 0,0% 0,9% | 0,9% |
| Erweiterung der OP | 0,0% | 0,1% 2,0% | 1,9% |
| Sonstiges | 0,0% | 0,0% 1,6% | 1,5% |

Q2 Q3 Q4 Q1/2018

Komplikationen intraoperativ Anästhesist

| | Ohne Bedeutung für Betreuung im AWR | | | Mit Bedeutung für Betreuung im AWR | | | Länger im AWR oder Verlegung | | |
|-------------------|-------------------------------------|---------------|---------|------------------------------------|--------------|---------|------------------------------|--------------|---------|
| | Praxis | Vergleich | Verlauf | Praxis | Vergleich | Verlauf | Praxis | Vergleich | Verlauf |
| Herz-Kreislauf | 0,0% | 3,0% 15,9% | 12,9% | 0,0% | 0,0% 1,3% | 1,3% | 0,0% | 0,0% 0,4% | 0,4% |
| Medikamente | 0,0% | 2,8% 15,3% | 12,5% | 0,0% | 0,0% 1,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% 0,0% | 0,0% |
| Respirationstrakt | 0,0% | 3,4% 16,9% | 13,5% | 0,0% | 0,3% 4,4% | 4,1% | 0,0% | 0,1% 2,0% | 1,9% |
| Techn. Probleme | 0,0% | 2,5% 15,6% | 12,7% | 0,0% | 0,0% 0,9% | 0,9% | 0,0% | 0,0% 0,0% | 0,0% |
| Aspiration | 0,0% | 2,9% 15,5% | 12,6% | 0,0% | 0,0% 0,9% | 0,9% | 0,0% | 0,0% 0,4% | 0,4% |
| Sonstiges | 0,0% | 2,9% 15,4% | 12,5% | 0,0% | 0,0% 1,7% | 1,7% | 0,0% | 0,0% 1,3% | 1,2% |

Q2 Q3 Q4 Q1/2018

Komplikationen postoperativ

| | Entzündung der Wunde | | | Fieber | | | Bluterguss/Nachblutung | | |
|-------------|----------------------|---------------|---------|--------|---------------|---------|------------------------|---------------|---------|
| | Praxis | Vergleich | Verlauf | Praxis | Vergleich | Verlauf | Praxis | Vergleich | Verlauf |
| Unbehandelt | — | 0,7% 6,1% | 6,1% | — | 1,2% 8,3% | 8,3% | — | 9,7% 22,2% | 22,2% |
| Behandelt | — | 3,1% 13,1% | 13,1% | — | 6,6% 18,6% | 18,6% | — | 4,5% 15,5% | 15,5% |

Q2 Q3 Q4 Q1/2018

Behandlung der postoperativen Komplikationen

Lesebeispiel: "...% der Patienten hatten einen Bluterguss, der mit einer Punktion behandelt wurde"

| | Entzündung der Wunde | | | Fieber | | | Bluterguss/Nachblutung | | |
|---------------|----------------------|---------------|---------|--------|---------------|---------|------------------------|---------------|---------|
| | Praxis | Vergleich | Verlauf | Praxis | Vergleich | Verlauf | Praxis | Vergleich | Verlauf |
| Medikamente | — | 2,5% 11,8% | 11,8% | — | 6,6% 18,6% | 18,6% | — | — | — |
| Spülung | — | 0,7% 6,3% | 6,3% | — | — | — | — | — | — |
| Salbenverband | — | — | — | — | — | — | — | 3,7% 14,1% | 14,1% |
| Punktion | — | — | — | — | — | — | — | 0,1% 1,9% | 1,9% |
| Sonstiges | — | 0,1% 2,6% | 2,6% | — | — | — | — | 0,8% 6,5% | 6,5% |

Q2 Q3 Q4 Q1/2018

Notfall vor der Entlassung

| | Praxis | Vergleich | Verlauf |
|---------------------|--------|--------------|---------|
| Stationäre Aufnahme | 0,0% | 0,2% 3,6% | 3,4% |

Q2 Q3 Q4 Q1/2018


Notfall nach der Entlassung

| | Praxis | Vergleich | Verlauf |
|-----------------------|--------|---------------|---------|
| Notfallmäßig zum Arzt | — | 1,9% 10,4% | 10,4% |


Q2 Q3 Q4 Q1/2018

5. Im Aufwachraum


Beschwerden im Aufwachraum




Im Aufwachraum



Schmerzmedikation am OP-Tag




Eltern im Aufwachraum




6. Zu Hause

Betreuung zu Hause



Beschwerden zu Hause

(0="Keine Schmerzen" bis 10="Unerträgliche Schmerzen")



7. Patientenzufriedenheit

Bewertung

(1="Sehr gut", 2="Gut", 3="Mittel", 4="Schlecht", 5="Sehr schlecht")

| Praxis & Praxisteam | | Mittelwert | Vergleich | Verlauf | | | | 1 - 2 | 4 - 5 |
|---------------------|--|------------|-----------|---------|----|----|---------|-------|-------|
| | | | | Q2 | Q3 | Q4 | Q1/2018 | | |
| | Organisation und Terminplanung | — | 1,34 | | | | 1,43 | — | — |
| | Erklärung des organisatorischen Ablaufs | — | 1,41 | | | | 1,30 | — | — |
| | Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft | — | 1,26 | | | | 1,49 | — | — |
| | Kindgerechte Betreuung | — | 1,36 | | | | 1,35 | — | — |
| | Kindgerechte Ausstattung der Praxis | — | 1,69 | | | | 1,43 | — | — |
| | Spielmöglichkeiten (Spiele, Bücher etc.) | — | 1,80 | | | | 1,31 | — | — |
| | Sauberkeit der Praxisräume | — | 1,29 | | | | 1,44 | — | — |

| Operateur | | Mittelwert | Vergleich | Verlauf | | | | 1 - 2 | 4 - 5 |
|-----------|---|------------|-----------|---------|----|----|---------|-------|-------|
| | | | | Q2 | Q3 | Q4 | Q1/2018 | | |
| | Gründliche Untersuchung | — | 1,31 | | | | 1,57 | — | — |
| | Erklärung der Diagnose | — | 1,29 | | | | 1,17 | — | — |
| | Erklärung der Operation | — | 1,39 | | | | 1,58 | — | — |
| | Aufklärung über Risiken und Vorteile | — | 1,47 | | | | 1,18 | — | — |
| | Information über weitere Behandlung nach OP | — | 1,42 | | | | 1,77 | — | — |

| Anästhesist | | Mittelwert | Vergleich | Verlauf | | | | 1 - 2 | 4 - 5 |
|-------------|--|------------|-----------|---------|----|----|---------|-------|-------|
| | | | | Q2 | Q3 | Q4 | Q1/2018 | | |
| | Aufklärung über Art und Ablauf der Narkose | — | 1,38 | | | | 1,48 | — | — |
| | Aufklärung über Risiken durch die Narkose | — | 1,55 | | | | 1,00 | — | — |
| | Aufklärung über notwendige "Nüchternzeit" | — | 1,20 | | | | 1,59 | — | — |
| | Zerstreuung der Angst vor der Narkose | — | 1,56 | | | | 1,00 | — | — |

| Zeit für offene Fragen... | | Genug | | | Zu wenig | Keine |
|---------------------------|----------------------------------|--------|-----------|---------|----------|-------|
| | | Praxis | Vergleich | Verlauf | | |
| | ...des Operateurs vor der OP | — | 94% | | 98% | — |
| | ...des Operateurs nach der OP | — | 94% | | 80% | — |
| | ...des Anästhesisten zur Narkose | — | 94% | | 100% | — |

| Verbesserungspotential | | Anteil mit größtem empfundenen Verbesserungsbedarf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | | | | | | | | | |
| | Freundlichkeit des Empfangspersonals | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Freundlichkeit des OP-Personals | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Beratung & Aufklärung durch den Operateur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Beratung & Aufklärung durch den Narkosearzt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persönl. Betreuung durch den Operateur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persönl. Betreuung durch den Narkosearzt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Betreuung nach der OP bis zur Entlassung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nachsorge (z.B. Verbandswechsel) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wartezeiten in der Praxis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wartezeit für Operationstermin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sauberkeit und Hygiene in der Praxis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Telefonische Erreichbarkeit der Praxis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Praxis | Vergleich | Verlauf |
|---|--------|-----------|---------|
| Würde Kind wieder ambulant operieren lassen | — | 98,9% | 100,0% |
| Würde Praxisklinik weiterempfehlen | — | 98,9% | 92,2% |