

# AQS1-Kinder Quartalsauswertung

## 4. Quartal 2018, Praxis 5347

### Grundgesamtheit

	Aktuelle Periode	Alle Perioden	
	Praxis	Praxis	Alle Praxen*
Arzt-Fragebögen	0	500	40.864
Patienten-Fragebögen	0	193	18.166
Patienten-Rücklaufquote	—	39%	44%

\*) Repräsentative Menge Fragebögen aus dem Gesamtkollektiv aller Praxen (1. Quartal 2012 bis 4. Quartal 2017)

## 1. Allgemeine Daten zum Patienten

### Geschlecht

	Praxis	Gesamt
Männlich	—	73%
Weiblich	—	27%

### Altersverteilung

Alter in Jahren	bis 1	2 bis 3	4 bis 6	7 bis 10	11 bis 15	ab 16
Praxis	—	—	—	—	—	—
Gesamt	5,6%	25,2%	43,7%	17,6%	7,1%	0,8%

### Ehemaliges Früh-/Mangelgeborenes

	Praxis	Gesamt
Früh-/Mangelgeborenes	—	0%


### Krankenversicherung

	Praxis	Gesamt
Gesetzlich	—	98%
Privat	—	1%
Selbstzahler	—	0%

### Wahl der Praxisklinik

	Praxis	Gesamt
Überweisung Hausarzt	—	9,1%
Überweisung Kinderarzt	—	35,1%
Vorerfahrung	—	20,5%
Empfehlung	—	23,9%
Telefonbuch/Branchenbuch	—	0,6%
Internet	—	3,2%
Sonstiges	—	16,3%

### Legende



MW=Mittelwert, SD=75% Standardabweichung

## 2. Gesundheitszustand des Patienten

### Beeinträchtigung durch Erkrankung

	Praxis	Gesamt
Gar nicht	—	40%
Gering	—	28%
Mittel	—	21%
Stark	—	10%
Sehr stark	—	1%

### Rückkehr in normale Aktivität

	Praxis	Gesamt
Nach der OP	—	6,9

Zeitangabe in Tagen

### Wundkontaminationsklasse

	Praxis	Vergleich
Aseptisch	—	50,7%
Bedingt aseptisch	—	39,9%
Kontaminiert	—	8,3%
Septisch	—	1,2%

### Medizinische Risikofaktoren

	Praxis	Vergleich
Herz-Kreislauf	—	0,7%
Gerinnungsstörung	—	0,1%
Respirationstrakt	—	11,5%
Thromboserisiko	—	0,0%
Adipositas	—	0,8%
Diabetes	—	0,1%
Allergie	—	2,4%
Stoffwechselstörung	—	0,2%
Krampfleiden	—	0,2%
Sonstiges	—	6,6%

### Dringlichkeit des Eingriffs

	Praxis	Vergleich
Elektiv	—	99,4%
Dringlich	—	0,5%
Notfall	—	0,1%

## 3. Operation

### Allgemeine Daten

	Praxis	Vergleich
Aufklärung zur Narkose vor dem OP-Tag	—	74,0%
Aufklärung zur Operation vor dem OP-Tag	—	99,4%
Second Opinion	—	15,4%
Primäreingriff	—	96,1%
Histologie entnommen	—	28,4%
Diagnose intraoperativ bestätigt	—	99,5%

### Verschiebung des OP-Termins

	Praxis	Vergleich
Einmal verschoben	—	9,5%
Mehr als einmal verschoben	—	1,6%

	Praxis	Vergleich
Wegen Erkrankung (festgestellt: Kinder-/Hausarzt)	—	7,0%
Wegen Erkrankung (festgestellt: Narkosearzt)	—	1,0%
Aus organisatorischen Gründen	—	3,6%

### Kurz vor der OP

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Wartezeit OP-Termin bis OP-Beginn (Minuten)	—	35,6	51,1 39,9 26,1%
Hektische Atmosphäre vor der Narkoseeinleitung	—	6,8%	7,2% 50,8%
Bei Narkoseeinleitung war Kind ängstlich/unruhig	—	31,8%	15,9%

Q1 Q2 Q3 Q4/2018

## Prämedikation

	Praxis	Vergleich
Keine	—	53,8%
Midazolam < 0,3	—	10,0%
Midazolam 0,3	—	9,6%
Midazolam 0,4	—	10,8%
Midazolam 0,5	—	14,6%
Midazolam 0,6	—	0,6%
Midazolam > 0,6	—	0,6%
Sonstige Medikation	—	14,7%

Midazolam in mg/kg KG

	Praxis	Vergleich
Orale Applikation	—	88,8%
Nasale Applikation	—	2,5%
Rektale Applikation	—	8,7%

	Praxis	Vergleich
Unzureichend	—	3,5%
Gut	—	96,4%
Überdosiert	—	0,1%

## OP-Organisation

	Praxis	Vergleich
Einleitungszeit	—	7,6
Schnitt-Naht-Zeit	—	26,7
OP-Blockierungszeit	—	44,4

Zeitangabe in Minuten

## Assistenz

	Mindestens eine		Durchschn. Anzahl	
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich
Ärztlich/Operateur	—	9,3%	—	0,1
Nicht ärztl./Operateur	—	96,5%	—	1,1
Nicht ärztl./Anästhesist	—	97,6%		

## Perioperative Medikation

	Prä-OP		Intra-OP		Post-OP	
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich
Analgetika	—	39,0%	—	81,1%	—	18,6%
Antibiotika	—	0,2%	—	2,0%	—	0,7%
Antiemetika	—	3,8%	—	27,5%	—	2,4%
Antikoagulantien	—	0,1%	—	0,1%	—	0,0%
Antihypertensiva	—	0,4%	—	1,1%	—	0,0%
Anticholinergika	—	2,8%	—	3,4%	—	0,1%
Antihypotensiva	—	0,1%	—	0,2%	—	0,0%
O2-Insufflation	—	13,9%	—	29,2%	—	20,7%
Sedativa	—	22,5%	—	31,1%	—	1,2%
Lokalanästhetika	—	4,8%	—	35,8%	—	3,6%
Infusion	—	5,5%	—	61,0%	—	9,7%
Sonstiges	—	3,2%	—	14,4%	—	0,6%

## Studienfeld

	A	B	C	D	E	F
Studienfeld	—	—	—	—	—	—

## Anästhesiedurchführung

	Praxis	Vergleich
Anästhesist	—	100,0%
Operateur	—	0,0%

## Narkose Einleitung

	Praxis	Vergleich
Maske	—	36,3%
i.v.	—	63,7%

## Art der Anästhesie

	Praxis	Vergleich
Intubationsnarkose	—	28,2%
Maskennarkose	—	5,0%
Kaudalanästhesie	—	1,3%
Larynxmaske	—	63,7%
Plexusanästhesie	—	0,1%
Peniswurzelblockade	—	17,0%
Lokalanästhesie	—	10,8%
Nervenblockade	—	1,4%
Sonstiges	—	0,2%

## 4. Komplikationen

### Komplikationen intraoperativ Operateur

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Blutung	—	0,4%	4,7%
Techn./Instrumentell	—	0,1%	2,8%
Nervenläsion	—	0,0%	0,4%
Abbruch der OP	—	0,0%	0,7%
Gewebsläsion	—	0,0%	0,9%
Erweiterung der OP	—	0,1%	1,9%
Sonstiges	—	0,0%	1,5%

Q1 Q2 Q3 Q4/2018

### Komplikationen intraoperativ Anästhesist

	Ohne Bedeutung für Betreuung im AWR			Mit Bedeutung für Betreuung im AWR			Länger im AWR oder Verlegung		
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf
Herz-Kreislauf	—	3,0%	12,9%	—	0,0%	1,3%	—	0,0%	0,4%
Medikamente	—	2,8%	12,5%	—	0,0%	1,0%	—	0,0%	0,0%
Respirationstrakt	—	3,4%	13,5%	—	0,3%	4,1%	—	0,1%	1,9%
Techn. Probleme	—	2,9%	12,7%	—	0,0%	0,9%	—	0,0%	0,0%
Aspiration	—	2,9%	12,6%	—	0,0%	0,9%	—	0,0%	0,4%
Sonstiges	—	2,9%	12,5%	—	0,0%	0,0%	—	0,0%	1,7%

Q1 Q2 Q3 Q4/2018

### Komplikationen postoperativ

	Entzündung der Wunde			Fieber			Bluterguss/Nachblutung		
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf
Unbehandelt	—	0,7%	6,1%	—	1,2%	8,3%	—	9,7%	22,2%
Behandelt	—	3,1%	19,0%	—	6,6%	18,6%	—	4,5%	15,5%

Q1 Q2 Q3 Q4/2018

### Behandlung der postoperativen Komplikationen

Lesebeispiel: "...% der Patienten hatten einen Bluterguss, der mit einer Punktion behandelt wurde"

	Entzündung der Wunde			Fieber			Bluterguss/Nachblutung		
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf	Praxis	Vergleich	Verlauf
Medikamente	—	2,5%	18,4%	—	6,6%	18,6%			
Spülung	—	0,7%	6,3%						
Salbenverband							—	3,7%	14,1%
Punktion							—	0,1%	1,9%
Sonstiges	—	0,1%	2,6%				—	0,8%	6,5%

Q1 Q2 Q3 Q4/2018

### Notfall vor der Entlassung

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Stationäre Aufnahme	—	0,2%	3,4%

Q1 Q2 Q3 Q4/2018

### Notfall nach der Entlassung

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Notfallmäßig zum Arzt	—	1,9%	10,4%

Q1 Q2 Q3 Q4/2018

## 5. Im Aufwachraum

### Beschwerden im Aufwachraum

	Ohne Bedeutung für Betreuung im AWR				Mit Bedeutung für Betreuung im AWR				Länger im AWR oder Verlegung auf Intensiv- oder Wachstation			
	Praxis	Vergleich	Verlauf		Praxis	Vergleich	Verlauf		Praxis	Vergleich	Verlauf	
Übelkeit	—	3,8%	-14,3%		—	0,2%	-3,7%		—	0,0%	-1,5%	
Erbrechen	—	3,5%	-13,9%		—	0,2%	-3,2%		—	0,0%	-1,4%	
Wundschmerzen	—	7,8%	-20,1%		—	2,2%	-10,9%		—	0,1%	-2,6%	
Agitation/Unruhe	—	6,3%	-18,2%		—	1,7%	-9,6%		—	0,2%	-3,7%	
Halsschmerzen	—	3,8%	-14,3%		—	0,9%	-7,1%		—	0,1%	-2,0%	
Kopfschmerzen	—	3,0%	-12,7%		—	0,0%	-1,1%		—	0,0%	-0,5%	
Kreislaufprobleme	—	3,0%	-12,7%		—	0,0%	-1,4%		—	0,0%	-0,7%	
Atmung	—	3,1%	-13,0%		—	0,2%	-3,1%		—	0,0%	-1,4%	
Allergische Reaktion	—	2,9%	-12,7%		—	0,0%	-1,0%		—	0,0%	-0,9%	
Harnverhalt	—	2,9%	-12,6%		—	0,0%	-0,5%		—	0,0%	-0,0%	

Q1 Q2 Q3 Q4/2018

### Im Aufwachraum

	Praxis	Vergleich	Verlauf	
Zeit (Minuten)	—	1120	-	
Beschwerden zu wenig beachtet	—	3,4%	-3,4%	
Schlechte Versorgung	—	2,6%	-3,1%	

Q1 Q2 Q3 Q4/2018

### Schmerzmedikation am OP-Tag

	Praxis	Vergleich	Verlauf	
Zu wenig Schmerzmittel	—	3,8%	-3,9%	

Q1 Q2 Q3 Q4/2018

### Eltern im Aufwachraum

	Praxis	Vergleich	Verlauf	
Verspätet beim Kind	—	4,3%	-4,2%	
Nicht beim Kind	—	5,3%	-17,5%	

Q1 Q2 Q3 Q4/2018

## 6. Zu Hause

### Betreuung zu Hause

	Praxis	Vergleich
Ausreichende Betreuung	—	99%

	Praxis	Vergleich	Verlauf	
OP-Team schlecht erreichbar	—	3,2%	-19,1%	

Q1 Q2 Q3 Q4/2018

### Beschwerden zu Hause

(0="Keine Schmerzen" bis 10="Unerträgliche Schmerzen")

	Durchschnittlich			Prozentual	
	Praxis	Vergleich	Verlauf	Keine	> 6
Erbrechen	—	0,39	-1,08	—	—
Schlafprobleme	—	0,87	-1,44	—	—
Kopfschmerzen	—	0,37	-0,92	—	—
Halsschmerzen	—	1,56	-2,09	—	—
Wundschmerzen bis 24 Std.	—	2,77	-1,98	—	—
Wundschmerzen nach 24 Std.	—	2,29	-1,81	—	—
Schwellung nach 24 Std.	—	1,93	-1,80	—	—
Schwierigkeiten beim Stuhlgang	—	0,46	-1,11	—	—
Probleme beim Wasserlassen	—	0,62	-1,29	—	—

Q1 Q2 Q3 Q4/2018

